



NUTRIENTES ORGÁNICOS Y MINERALES S.A. DE C.V.

3-3-52

Ficha Técnica



*****TOLERANCIA AL FRIO E INCREMENTO DE AZUCARES*****

CONTENIDOS GARANTIZADOS	
NITROGENO	3.00%
FOSFORO	3.00%
POTASIO	52.00%
INERTES Y ACONDICIONADORES	42.00%



INFORMACION GENERAL

DESCRIPCION.-

3-3-52. Es un fertilizante altamente soluble en agua recomendado para utilizarse a los inicios de la floración y fructificación de los cultivos ya que su formulación contiene grandes cantidades de Potasio el cual es esencial en la producción de frutos y flores de gran calidad y de larga vida de anaquel

CARACTERISTICAS.-

3-3-52. Aporta grandes cantidades de Potasio y micro elementos Quelatados con EDTA, además de que ayuda a mejorar la síntesis de azúcares.

BENEFICIOS.-

3-3-52. Favorece a una mejor calidad de granos y frutos. Su aplicación permite obtener frutos de mejor tamaño, coloración y cantidad de azúcares, además de que brinda una mayor tolerancia al frío.

NUTRIENTES ORGANICOS Y MINERALES, S.A. DE C.V.
EJERCITO NACIONAL No. 90 FRACC. EL TAPATIO
C.P. 45588 TLAQUEPAQUE, JALISCO TELEFONO (33)36063086
e-mail: nomsa@hotmail.com; gabyduran@hotmail.com



NUTRIENTES ORGÁNICOS Y MINERALES S.A. DE C.V.

3-3-52

Ficha Técnica



POR QUE UTILIZAR 3-3-52

PORQUE: Favorece la síntesis de azúcares e incremento de grados Brix.

PORQUE: Favorece la regulación osmótica en la planta.

PORQUE: Ayuda a mejorar el contenido de azúcares de frutos y granos.

PORQUE: Brinda mayor coloración a frutos.

PORQUE: Incrementa la tolerancia al frío.

INSTRUCCIONES DE USO

3-3-52 está formulado para ser totalmente disuelto en agua y puede ser aplicado en diferentes formas: Riego por goteo, Hidroponía, Drench, Micro aspersión y Foliarmente.

USO	DOSIS	RECOMENDACIONES
AGUACATE	2 – 3 Kg/Ha	Aplicar después de los 45 días de amarre del fruto.
AVENA, CEBADA MAIZ, SORGO, TRIGO	2 – 3 Kg/Ha	Aplicar antes de la floración y repetir 7 días después.
AJO Y CEBOLLA	2 – 3 Kg /Ha	Realizar las aplicaciones al inicio del llenado y repetir a los 8 días.
BERENJENA, CALABAZA MELON, PEPINO, SANDIA CHILE Y TOMATE	2 – 4 Kg /Ha	Aplicar 7 días antes de la fructificación y repetir cada 7 días.
FRIJOL Y SOYA	1 – 2 Kg /Ha	Realizar las aplicaciones al inicio de la floración y repetir a los 10 días.
FRESA Y ZARZAMOR	2 – 3 Kg /Ha	Iniciar las aplicaciones en prefloración y repetir cada 8 días.
VID	1 – 2 Kg /Ha	Aplicar desde la formación de las bayas y repetir cada 10 días.

NUTRIENTES ORGANICOS Y MINERALES, S.A. DE C.V.

EJERCITO NACIONAL No. 90 FRACC. EL TAPATIO

C.P. 45588 TLAQUEPAQUE, JALISCO TELEFONO (33)36063086

e-mail: nomsa@hotmail.com; gabyduran@hotmail.com